

Samlet statistik 29 år Hjemmefødselsordning Sjælland 1991-2019	20 år		9 år		29 år		
	1991-2010		2011-2019		1991-2019		
	Antal	%	Antal	%	Antal	%	
Indskrevne			3420	100,0			
Førstegangsfødende			833	24,4			
Flergangsfødende			2587	75,6			
Omvisiterede			654	19,1			
Førstegangsfødende			242	29,1			
Flergangsfødende			412	15,9			
Start fødsel hjemme	1663	100,0	2766	100,0	4429	100,0	
Førstegangsfødende	368	22,13	590	21,3	958	21,6	
Flergangsfødende	1295	77,87	2175	78,6	3470	78,3	
Overflyttet til sygehus før barnets fødsel	186	11,18	293	10,6	479	10,8	
Førstegangsfødende	116	31,5	197	33,4	313	32,7	
ukompliceret fødsel efter overflytning*			89	15,1			
Flergangsfødende	70	5,4	96	4,4	166	4,8	
ukompliceret fødsel efter overflytning*			63	2,9			
Epidural			91	5,5			
S-drop	85	5,1	162	9,7	247	5,6	
Sugekop / tang	45	2,7	54	2,0	99	2,2	
Episiotomi (klip)	33	2,0	19	0,7	52	1,2	
Akut kejsersnit (alle fødende)	58	3,5	72	2,6	130	2,9	
Bristning gr. III/IV** (alle fødende)	18	1,1	7	0,3	25	0,6	
Afsluttet fødsel hjemme	1477	88,82	2473	89,4	3950	89,2	
Førstegangsfødende	252	68,48	393	66,6	645	67,3	
Flergangsfødende	1225	94,59	2079	95,6	3304	95,2	
Vandfødsler	900	54,12	1405	50,8	2305	52,0	
RKKP-indikatorer alle fødende***	1663	100,0	2766	100,0	4429	100,0	Standard
3) Bristning gr. III/IV, (1. gangs-)			15	2,5			≤ 6,0
5) Blødning ≥ 1000 ml			71	2,6			≤ 4,0
7b) Svær hypoxi (Apgar < 7/5)			11	0,4			≤ 1,0
8A) Ukomplic. forløb (1. gangs-)			448	75,9			≥ 60
8B) Akut sectio (1. gangs-) til termin (37-42), barn i HS			51	8,6			ingen
Overflyttet efter barnets fødsel	62	3,7	93	3,4	155	3,5	
Førstegangsfødende	35	9,5	41	6,9	76	7,9	
Flergangsfødende	27	2,1	52	2,4	79	2,3	
Fastsiddende moderkage			29	1,0			
Blødning			18	0,7			
Syning af større bristning			19	0,7			
Svangerskabsforgiftning (præeklampsi)			2	0,1			
Påvirket barn			25	0,9			
Andel af fødende overflyttet før og efter fødslen	248	14,9	386	14,0	634	14,3	
Førstegangsfødende	151	41,0	238	40,3	389	40,6	
Flergangsfødende	97	7,5	148	6,8	245	7,1	

* ukompliceret fødsel efter overflytning: epidural og S-drop gør ikke fødslen kompliceret (jf. RKKP)

** bristning gr. III/IV: involverer endetarmsmusklen

*****RKKP-indikatorer: registrering start i 2011**

Indikator 1: Andelen af fødepiduraler/fødespinaler, hvor anlæggelsen startes (procedurestart) indenfor en time fra de er bestilt (sygehus)

Indikator 2: Andelen af fødende, der kontinuerligt har tilstedeværelse af fagpersonale på fødestuen (udgået)

Indikator 3: Andelen af førstegangsfødende, der får svære bristninger af mellemkødet (grad III eller grad IV)

Indikator 4A: Andelen af fødende, der føder ved akut kejsersnit i.h.t. det tidsinterval kejsersnittet er meldt under, grad 1 \leq 15 min (sygehus)

Indikator 4B: Andelen af fødende, der føder ved akut kejsersnit i.h.t. det tidsinterval kejsersnittet er meldt under, grad 2 \leq 30 min (sygehus)

Indikator 5: Andelen af kvinder med målt blodtab \geq 1000 ml indenfor 2 timer efter fødslen

Indikator 6: Andelen af fødsler, hvor der umiddelbart efter fødslen etableres hud til hud kontakt mellem mor og barn (udgået)

Indikator 7b: Andelen af børn med Apgar $<$ 7 efter 5 min.

Indikator 8A: Andelen af ukomplicerede fødselsforløb med fødsel af et rask barn hos førstegangsfødende

Andelen af ukomplicerede fødsler (ikke kejsersnit, ikke cup eller tang, ikke episiotomi, ikke grad III eller IV bristninger, ikke blødning \geq 1000 ml.) med fødsel af rask barn, der får Apgar \geq 9/5

Indikator 8B: Andelen af akut kejsersnit hos førstegangsfødende til tiden med barn i hovedstilling

Indikator 9: Andelen af akutte kejsersnit, grad 2, der foretages i regional anæstesi (sygehus)

https://www.sundhed.dk/content/cms/66/4666_dansk-kvalitetsdatabase-for-fdsler-opdateret-marts-2018-aarsrapport-dkf.pdf